

## ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO

**Para usar durante junio del 2024**

**Para más información:**

Don Ferreira (630) 481-1025

*dferreira@rsna.org*

**OBJETO: JUNIO ES EL MES NACIONAL DE LA SALUD MASCULINA**

**Tiempo: 60 segundos**

El aneurisma de la aorta abdominal o “triple A” es una condición común que puede llevar a la muerte súbita en hombres fumadores de edad avanzada. Es tratable cuando se la detecta de forma temprana.

El “triple A” se presenta generalmente en hombres fumadores de más de 60 años de edad. El aneurisma generalmente no presenta síntomas y puede aumentar de tamaño lentamente durante un periodo de años. A medida que crece, también aumenta la probabilidad de que se rompa o reviente. Muy pocas personas sobreviven a una ruptura de un “triple A”.

Síntomas de ruptura de una “triple A” pueden incluir, dolor abdominal o de espalda intenso y dificultad para respirar. El tabaquismo, el colesterol alto, la presión alta, y una historia familiar de “triple A” pueden aumentar su riesgo.

Todos los hombres de entre 65 y 75 años de edad que hayan fumado deberían hacerse por única vez un examen de detección temprana mediante ultrasonido, incluso si no presentan síntomas.

Para más información, visite [Radiology-Info-punto.org](http://Radiology-Info-punto.org)

###